

ATLAS DES MANGROVES DE NOUVELLE-CALÉDONIE



ZON4Co

PROGRAMME D'ÉVALUATION DES RESSOURCES MARINES
DE LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE DE NOUVELLE CALÉDONIE

S. VIRLY

Janvier 2008



L'atlas des mangroves de Nouvelle-Calédonie a été réalisé dans le cadre de l'opération ZoNéCo 2006 intitulée :

« Typologie et biodiversité des mangroves de Nouvelle-Calédonie »

LES MANGROVES

EN QUELQUES CHIFFRES ...

35 100 hectares de mangrove dont :

- 25 900 ha de forêt arbustive ou arborescente
 - 55% de formations à *Rhizophora* spp. dominants
 - 14% de formations à *Avicennia marina* dominant
- 9 200 ha de tannes nus ou vifs et marais

88% sur la côte Ouest

- 59% en Province Nord
- 40% en Province Sud
- 1% dans la Province des Iles

Prédominance des mangroves de fond de baie

- 40% de mangrove de fond de baie (44% côte Ouest / 12% côte Est)
- 26% de patchs ou cordons littoraux (66% côte Est – 20% côte Ouest)
- 20% de mangroves estuariennes (21% côte Ouest – 11% côte Est)

Planche	Echelle	Côte	Région	Site
1	20 000	OUEST	ile Ouen	
2	15 000	OUEST	PRONY	Baie du Carénage
3	10 000	OUEST	PRONY	Baie de la Somme
4	20 000	OUEST	PRONY	Baie de Prony
5	10 000	OUEST	MONT DORE	Baie de Plum
6	12 000	OUEST	MONT DORE	Mont Dore Sud
7	10 000	OUEST	MONT DORE	Val de Dore
8	10 000	OUEST	MONT DORE	La Coulee & Déchetterie
9	10 000	OUEST	MONT DORE	Saint Louis
10	10 000	OUEST	MONT DORE	Robinson
11	10 000	OUEST	MONT DORE	Conception Pont des Français
12	10 000	OUEST	NOUMEA	Tina
13	10 000	OUEST	NOUMEA	Magenta
14	10 000	OUEST	NOUMEA	Ouemo
15	10 000	OUEST	NOUMEA	4ieme
16	10 000	OUEST	NOUMEA	Kaméré - Tindu
17	12 000	OUEST	KOUTIO	Baie de Koutio-Koueta
18	10 000	OUEST	DUMBEA	Anse Apogol - Baie de Taa
19	15 000	OUEST	DUMBEA	Rivière Dumbéa
20	10 000	OUEST	PAITA	Baie Gadji
21	10 000	OUEST	PAITA	Baie Taurau
22	18 000	OUEST	PAITA	Ondémie
23	13 000	OUEST	PAITA	Pot Laguerre
24	10 000	OUEST	PAITA	Baie de Nénoué
25	10 000	OUEST	SAINT VINCENT	Champ de malheur
26	17 000	OUEST	SAINT VINCENT	Presqu'île de Utiot
27	10 000	OUEST	SAINT VINCENT	Baie inaccessible
28	20 000	OUEST	SAINT VINCENT	Presqu'île de Montagnés
29	20 000	OUEST	SAINT VINCENT	Rivière La Tamo
30	10 000	OUEST	SAINT VINCENT	Rivière La Tentouta
31	18 000	OUEST	SAINT VINCENT	Nord Rivière La Tentouta
32	10 000	OUEST	SAINT VINCENT	Baie Ouenghi
33	12 000	OUEST	SAINT VINCENT	Rivière Ouenghi
34	10 000	OUEST	SAINT VINCENT	Presqu'île Beuprès
35	10 000	OUEST	SAINT VINCENT	Baie Deama
36	16 000	OUEST	SAINT VINCENT	Nord Baie Deama
37	16 000	OUEST	SAINT VINCENT	Baie Derema
38	16 000	OUEST	SAINT VINCENT	Bouraké
39	50 000	OUEST	SAINT VINCENT	Ilots de la Baie de Saint Vincent
40	10 000	OUEST	LA FOA	Presqu'île Rousseau
41	15 000	OUEST	LA FOA	Presqu'île Gardier
42	25 000	OUEST	LA FOA	Nord presqu'île Gardier
43	25 000	OUEST	LA FOA	Sud Ouano
44	15 000	OUEST	LA FOA	Presqu'île Ouano
45	16 000	OUEST	LA FOA	Baie de Chambrayon
46	16 000	OUEST	LA FOA	Baie de Fon
47	25 000	OUEST	LA FOA	Presqu'île Lebris
48	26 000	OUEST	LA FOA	Rivière La Foa
49	12 000	OUEST	MOINDOU	Fort Térémba
50	10 000	OUEST	MOINDOU	Presqu'île Tanghy
51	16 000	OUEST	MOINDOU	Presqu'île Grandio
52	15 000	OUEST	MOINDOU	Rivière Moindou
53	12 000	OUEST	MOINDOU	Baie Moindou
54	12 000	OUEST	MOINDOU	Kela
55	10 000	OUEST	MOINDOU	Pointe Carré Février
56	10 000	OUEST	MOINDOU	Pointe Martin
57	20 000	OUEST	MOINDOU	Pointe Noire
58	15 000	OUEST	BOURAIL	Pointe Bellenguez
59	13 000	OUEST	BOURAIL	Rivière Nissadoul
60	12 000	OUEST	BOURAIL	Rivière Néra
61	14 000	OUEST	BOURAIL	Coupee Cap Goulvain
62	18 000	OUEST	POYA	Kapuides
63	20 000	OUEST	POYA	Beauprès - Ouaneço
64	20 000	OUEST	POYA	Point Mogin
65	10 000	OUEST	POYA	Presqu'île Peni
66	26 000	OUEST	POYA	Baie de Poya
67	10 000	OUEST	POYA	Anse Mondoni
68	12 000	OUEST	POYA	Presqu'île Beco
69	20 000	OUEST	POYA	Baie Nékoro
70	15 000	OUEST	POYA	Baie de Mueo
71	13 000	OUEST	POYA	Baie de Nangapi
72	12 000	OUEST	POYA	Presqu'île Pindai
73	13 000	OUEST	POYA	Baie de Kuhn

Planche	Echelle	Côte	Région	Site
74	15 000	OUEST	VOH-KONE-POUEMBOUT	Plaine des Galies
75	20 000	OUEST	VOH-KONE-POUEMBOUT	Baie Blanche
76	12 000	OUEST	VOH-KONE-POUEMBOUT	Plage de Franco
77	14 000	OUEST	VOH-KONE-POUEMBOUT	Goyeta
78	10 000	OUEST	VOH-KONE-POUEMBOUT	Nord Goyeta
79	25 000	OUEST	VOH-KONE-POUEMBOUT	Pouembout
80	10 000	OUEST	VOH-KONE-POUEMBOUT	Presqu'île de Foué
81	25 000	OUEST	VOH-KONE-POUEMBOUT	Kone - Kataviti
82	15 000	OUEST	VOH-KONE-POUEMBOUT	Pinjen
83	15 000	OUEST	VOH-KONE-POUEMBOUT	Ile Pingiane
84	10 000	OUEST	VOH-KONE-POUEMBOUT	Oungdo
85	15 000	OUEST	VOH-KONE-POUEMBOUT	Pointe Vavouto
86	18 000	OUEST	VOH-KONE-POUEMBOUT	Anse Vavouto
87	15 000	OUEST	VOH-KONE-POUEMBOUT	Presqu'île de Galope
88	24 000	OUEST	TEMALA - POUANGA	Baie Chasseloup
89	12 000	OUEST	TEMALA - POUANGA	Anse Poussol
90	12 000	OUEST	TEMALA - POUANGA	Canecout
91	15 000	OUEST	TEMALA - POUANGA	Anse Pouanga
92	13 000	OUEST	QUACO	Pointe Palépe
93	13 000	OUEST	QUACO	Tehelte
94	10 000	OUEST	QUACO	Sud Quaco
95	12 000	OUEST	QUACO	Nord Quaco
96	18 000	OUEST	QUACO	Tou & Tinip
97	16 000	OUEST	KAALA-GOMEN	Est Baie Gomen
98	22 000	OUEST	KAALA-GOMEN	Nord Baie Gomen
99	14 000	OUEST	KAALA-GOMEN	Plaine de Bo
100	10 000	OUEST	KOUMAC	Wharf Karamé
101	10 000	OUEST	KOUMAC	Sud Pandop
102	10 000	OUEST	KOUMAC	Nord Pandop
103	10 000	OUEST	KOUMAC	Quang
104	10 000	OUEST	KOUMAC	Aérodrome Koumac
105	17 000	OUEST	KOUMAC	Sud Pagaoumé
106	15 000	OUEST	KOUMAC	Baie d'Ohiand
107	20 000	OUEST	POUM	Baie de Nehoué
108	20 000	OUEST	POUM	Nord Baie Nehoué
109	13 000	OUEST	POUM	Plateau de Tho - Ponté à Kim
110	15 000	OUEST	POUM	Ile de Boh
111	15 000	OUEST	POUM	Presqu'île de Gotonne
112	15 000	OUEST	POUM	Anse de Pouani
113	12 000	OUEST	POUM	Baie de Poum
114	10 000	OUEST	POUM	Nord Baie Poum
115	10 000	OUEST	POUM	Presqu'île Tébane
116	10 000	OUEST	POUM	Sud Baie Banaré
117	13 000	OUEST	POUM	Nord Baie Banaré
118	12 000	OUEST	POUM	Pointe Tiabet
119	18 000	OUEST	POUM	Nord Tiabet
120	15 000	OUEST	POUM	Sud Ile Baaba
121	15 000	OUEST	POUM	Nord Ile Baaba
122	18 000	OUEST	POUM	Sud Ile Yandé
123	15 000	OUEST	BELEP	Sud Ile Art
124	20 000	OUEST	BELEP	Nord Ile Art
125	10 000	OUEST	BELEP	Sud Ile Pott
126	15 000	OUEST	BELEP	Nord Ile Pott
127	10 000	EST	POUM	Poingane
128	10 000	EST	POUM	Pointe Pouthier
129	10 000	EST	POUM	Bayu
130	10 000	EST	POUM	Cabwi - Maa la Bosc
131	10 000	EST	POUM	Nord Pointe Oump
132	15 000	EST	ARAMA	Pujam
133	15 000	EST	ARAMA	Narac - Phagaany
134	15 000	EST	ARAMA	Arama
135	15 000	EST	ARAMA	Bwalayet
136	20 000	EST	DIAHOT	Sud Ile Balabio
137	20 000	EST	DIAHOT	Ouest Ile Balabio
138	20 000	EST	DIAHOT	Nord Ile Balabio
139	10 000	EST	DIAHOT	Baie Pilou
140	15 000	EST	DIAHOT	Embouture Diahot
141	20 000	EST	DIAHOT	Flueve intermédiaire Diahot
142	23 000	EST	DIAHOT	Flueve amont Diahot
143	20 000	EST	DIAHOT	Ouegga
144	20 000	EST	DIAHOT	Pam
145	15 000	EST	DIAHOT	Tian

Planche	Echelle	Côte	Région	Site
146	15 000	EST	BALADE-POUEBO	Maam
147	15 000	EST	BALADE-POUEBO	Sainte Marie Saint Paul
148	18 000	EST	BALADE-POUEBO	Pouébo
149	17 000	EST	BALADE-POUEBO	Tchabouenne
150	13 000	EST	BALADE-POUEBO	Oubatche
151	25 000	EST	BALADE-POUEBO	De Cap Colnett au Mont Panie
152	25 000	EST	HIENGHENE	Panie
153	15 000	EST	HIENGHENE	Rivière Tanghène
154	15 000	EST	HIENGHENE	Baie Hienghène
155	12 000	EST	HIENGHENE	Linderakhe
156	10 000	EST	HIENGHENE	Tinpiné
157	10 000	EST	HIENGHENE	Maina
158	12 000	EST	TOUHO	Vieux Touho
159	10 000	EST	TOUHO	Baie Touho
160	10 000	EST	TOUHO	Aérodrome de Touho
161	14 000	EST	TOUHO	Kokengonen - Thwaka
162	12 000	EST	POINDIMIE	Saint Denis
163	10 000	EST	POINDIMIE	Rivière Amos
164	10 000	EST	POINDIMIE	Paama
165	15 000	EST	POINDIMIE	Paabu - Wido
166	10 000	EST	POINDIMIE	Nord Tchamba
167	20 000	EST	POINDIMIE	Rivière Tchamba
168	15 000	EST	PONERIHOUEN	Rivière Ponérihouen
169	10 000	EST	PONERIHOUEN	Rivière Mox
170	10 000	EST	PONERIHOUEN	Embouture Monéo
171	12 000	EST	PONERIHOUEN	Nord Baie Ugué
172	15 000	EST	HOUILLOU	Cap Bocage
173	12 000	EST	HOUILLOU	Baie Lebris
174	10 000	EST	HOUILLOU	Néko
175	10 000	EST	HOUILLOU	Houailou
176	15 000	EST	KOUAOUA	Kouao
177	15 000	EST	CANALA	Baie de Canala
178	10 000	EST	CANALA	Pot Mackau
179	20 000	EST	CANALA	Ouassee
180	10 000	EST	THIO	Thio
181	18 000	EST	THIO	Ile Niénu
182	18 000	EST	THIO	Ile Tupeti
183	18 000	EST	THIO	Grand Borind
184	12 000	EST	THIO	Saint Jean Baptiste
185	12 000	EST	THIO	Petit Borind
186	20 000	EST	THIO	Ouiné
187	15 000	EST	YATE	Petit Ouina
188	15 000	EST	YATE	Mamie à Murto
189	15 000	EST	YATE	Wé Ngré
190	16 000	EST	YATE	Nord Baie de Yate (Wé Béréké)
191	20 000	EST	YATE	Presqu'île Kwe Binyi
192	20 000	EST	YATE	Ile Nu Hee
193	10 000	ILE	OUEVA	Ekne
194	15 000	ILE	OUEVA	Tia Sala
195	15 000	ILE	OUEVA	Nigimec

DIFFÉRENTES STRATES VÉGÉTALES



STRATE	DESCRIPTION
Formation à <i>Rhizophora</i> spp.	majoritaire dans la formation
Formation à <i>Avicennia marina</i>	majoritaire dans la formation ou mélange d' <i>Avicennia</i> et <i>Rhizophora</i> courts
Tanne nu	avec ou sans voile algal
Tanne vif ou avec arbustes épars ou avec souches	avec <i>Salicornes</i> ou autres plantes grasses ou arbustes épars ou souches mortes
Zone envasée et/ou inondée	
Formation mixte d'arrière mangrove	Formation mixte interne 1 : <i>Excoecaria agallocha</i> et/ou <i>Lumnitzera</i> spp. et/ou <i>Heritiera littoralis</i> et/ou <i>Hibiscus</i> et/ou <i>Thespesia</i> et/ou <i>Sciphyphora</i>
Formation à <i>Bruguiera</i> et espèces associées	Formation interne mixte 2 : <i>Bruguiera</i> et/ou <i>Acrostichum</i> et/ou <i>Xylocarpus granatum</i> et/ou <i>Heritiera littoralis</i> et/ou <i>Acanthus</i> et <i>Rhizophora</i> , voire <i>Excoecaria</i>
Autres formation monospécifique ou mixte	[mélange de "downstream" <i>Rhizophora</i> , <i>Avicennia</i> , <i>Sciphyphora</i> , <i>Sonneratia</i> , <i>Lumnitzera</i>] OU [mélange "upstream" <i>Rhizophora</i> , <i>Hibiscus</i> , <i>Acanthus</i>] OU [autres formations monospécifiques : <i>Lumnitzera</i> ou <i>Sonneratia</i> ou <i>Ceriops</i>]
Végétation non inféodée à la mangrove	Prairie, savane à niaoulis, acacias, etc. (<i>Meleuleuca</i> , etc.) incluse dans une mangrove
Mangrove morte ou convertie	soit morte, soit en friche, soit convertie en bassins aquacoles ou autres ouvrages
Végétation indéterminée	mangrove ou non
Marécage à cypéracées	




Localisation des mangroves de Nouvelle-Calédonie

Référentiel géodésique RGNC 1991


Source de données : DITT & DTSI
Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



0 25 50 100 Kilomètres

Echelle : 1:1 800 000



Physiographie des mangroves de Nouvelle-Calédonie

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTS & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation




Type de mangrove

- Fond de baie
- Patch littoral
- Estuarienne
- Intermédiaire
- Fluviale
- Ilot en mer
- Lagunaire
- Patch interne

0 3 6 12 Kilomètres

Echelle : 1:300 000



Physiographie des mangroves de Nouvelle-Calédonie

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTS & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation




Type de mangrove

- Fond de baie
- Patch littoral
- Estuarienne
- Intermédiaire
- Fluviale
- Ilot en mer
- Lagunaire
- Patch interne

0 3 6 12 Kilomètres

Echelle : 1:300 000



Physiographie des mangroves de Nouvelle-Calédonie

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTS & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Type de mangrove

- Fond de baie
- Patch littoral
- Estuarienne
- Intermédiaire
- Fluviale
- Ilot en mer
- Lagunaire
- Patch interne

0 3 6 12 Kilomètres

Echelle : 1:300 000

Physiographie des mangroves de Nouvelle-Calédonie

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTS & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation




Type de mangrove

- Fond de baie
- Patch littoral
- Estuarienne
- Intermédiaire
- Fluviale
- Îlot en mer
- Lagunaire
- Patch interne

0 3 6 12 Kilomètres

Echelle : 1:300 000



Ile Ouen (zone est)

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTST


Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non infodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non infodée à la mangrove
- Végétation dense non infodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Maraîchage à Cyprès



Baie de Somme PRONY

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTST


Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Baie de Plum

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI


Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Sud Mont Dore

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI


Réalisation : Sabrina Virly Consultant


Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Maraîchage à Cypéracées





Vallon Dore

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI


Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Maraîchage à Cypéracées



La Coulée

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTST


Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguliera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguliera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Maraîchage à Cypéracées



Saint Louis Saint Michel

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI


Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non infodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non infodée à la mangrove
- Végétation dense non infodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Maraécage à Cypéracées



Robinson

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI



Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vil ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Maraîchage à Cypéracées



Conception Pont des Français

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTISI



Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Maraîchage à Cypéracées



Baie de Magenta

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI



Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Ouémo NOUMEA

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation




Classification botanique simple et structurale


- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



0 160 320 640 Mètres

Echelle : 1:10 000





Kaméré - Tindu NOUMEA

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTISI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant


Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées





Baie de Koutio Kouéta

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI


Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Rivière Dumbéa DUMBEA

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTST



Réalisation : Sabrina Virly Consultant


Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées





Baie Gadji PAITA

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTISI


Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Baie Taureau PAITA

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI



Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Ondémia PAITA

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTST


Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:18 000

Baie Nénouré PAITA

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI


Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Champ de Malheur SAINT VINCENT

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI



Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Maraîchage à Cypéracées



Presqu'île Uitoé SAINT VINCENT

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI


Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non infodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non infodée à la mangrove
- Végétation dense non infodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Baie Inaccessible SAINT VINCENT

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI


Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non infodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non infodée à la mangrove
- Végétation dense non infodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Presqu'île Montagnés SAINT VINCENT

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTST

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



0 335 670 1 340 Mètres

Echelle : 1:20 000

Rivière Tamoia SAINT VINCENT

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTISI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation




Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non infodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non infodée à la mangrove
- Végétation dense non infodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



0 330 660 1 320 Mètres
 Echelle : 1:20 000



Sud Rivière Tontouta SAINT VINCENT

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



0 165 330 660 Mètres

Echelle : 1:10 000

Nord Rivière Tontouta SAINT VINCENT

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



0 250 500 1 100 Mètres

Echelle : 1:18 000

Baie Ouenghi SAINT VINCENT

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI



Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Rivière Ouenghi SAINT VINCENT

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTST

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation




Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



0 185 370 740 Mètres

Echelle : 1:12 000



Baie Déama SAINT VINCENT

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Nord Baie Déama SAINT VINCENT

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI


Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Baie Arembou SAINT VINCENT

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI


Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Bouraké SAINT VINCENT

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI



Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Ilots de la baie SAINT VINCENT

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTST

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



0 750 1 500 3 000 Mètres
 Echelle : 1:50 000

Presqu'île Rousseau LA FOA - MOINDOU

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI



Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Presqu'île Gardner LA FOA - MOINDOU

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI


Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Sud Ouano LA FOA - MOINDOU

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI


Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Sud Ouano LA FOA - MOINDOU

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI


Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Presqu'île Ouano LA FOA - MOINDOU

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI



Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non infodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non infodée à la mangrove
- Végétation dense non infodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Baie chambeyron LA FOA - MOINDOU

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI


Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées




Baie Foni LA FOA - MOINDOU

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant


Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées





Presqu'île Lebris LA FOA - MOINDOU

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI


Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Rivière La Foa LA FOA - MOINDOU

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI


Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Fort Téremba LA FOA - MOINDOU

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI


Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Presqu'île Tanghi LA FOA - MOINDOU

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant


Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées

N
 0 125 250 500 Mètres
 Echelle : 1:10 000



Presqu'île Grandjo LA FOA - MOINDOU

Référentiel géodésique RGNC 1991


Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



- Classification botanique simple et structurale**
- Formation de Rhizophora clairsemé
 - Formation de Rhizophora moyennement dense
 - Formation de Rhizophora dense
 - Formation d'Avicennia clairsemé
 - Formation d'Avicennia moyennement dense
 - Formation d'Avicennia dense
 - Tanne nu
 - Tanne vif ou avec petit arbuste
 - Zone envasée ou inondée
 - Formation d'arrière mangrove clairsemée
 - Formation d'arrière mangrove moyennement dense
 - Formation d'arrière mangrove dense
 - Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
 - Formation mixte à Bruguiera dense
 - Autre formation mixte clairsemée
 - Autre formation mixte moyennement dense
 - Autre formation mixte dense
 - Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
 - Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
 - Végétation dense non inféodée à la mangrove
 - Mangrove morte ou convertie
 - Végétation indéterminée clairsemée
 - Végétation indéterminée moyennement dense
 - Végétation indéterminée dense
 - Marécage à Cypéracées



Baie Moindou LA FOA - MOINDOU

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI



Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Kélé LA FOA - MOINDOU

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITT & DTSI



Réalisation : Sabrina Virly Consultant


Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées





Pointe Carré Février LA FOA - MOINDOU

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI


Réalisation : Sabrina Virly Consultant


Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées





Pointe Martin LA FOA - MOINDOU

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées

N
 0 115 230 460 Mètres
 Echelle : 1:10 000

Pointe Noire LA FOA - MOINDOU

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI



Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Pointe Bellenguez BOURAIL

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant


Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées

N
 0 162.5 325 650 Mètres
 Echelle : 1:15 000



Rivière Nessadiou BOURAIL

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTISI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées

N

 0 125 250 500 Mètres
 Echelle : 1:13 000

Rivière Néra BOURAIL

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant


Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées

N
 0 112.5 225 450 Mètres
 Echelle : 1:12 000



Cap Goulvain BOURAIL

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées

N
 0 120 240 480 Mètres
 Echelle : 1:14 000

Beauprés - Ouanéco POYA

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées

N
 0 162.5 325 650 Mètres
 Echelle : 1:20 000

Pointe Moglin POYA

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI


Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



- Classification botanique simple et structurale**
- Formation de Rhizophora clairsemée
 - Formation de Rhizophora moyennement dense
 - Formation de Rhizophora dense
 - Formation d'Avicennia clairsemée
 - Formation d'Avicennia moyennement dense
 - Formation d'Avicennia dense
 - Tanne nu
 - Tanne vif ou avec petit arbruste
 - Zone envasée ou inondée
 - Formation d'arrière mangrove clairsemée
 - Formation d'arrière mangrove moyennement dense
 - Formation d'arrière mangrove dense
 - Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
 - Formation mixte à Bruguiera dense
 - Autre formation mixte clairsemée
 - Autre formation mixte moyennement dense
 - Autre formation mixte dense
 - Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
 - Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
 - Végétation dense non inféodée à la mangrove
 - Mangrove morte ou convertie
 - Végétation indéterminée clairsemée
 - Végétation indéterminée moyennement dense
 - Végétation indéterminée dense
 - Marécage à Cypéracées

N
 0 162.5 325 650 Mètres
 Echelle : 1:20 000




Presqu'île Porwi POYA

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



0 80 160 320 Mètres

Echelle : 1:10 000

Baie de Poya

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



0 180 360 720 Mètres

Echelle : 1:26 000

Anse Mondoni POYA

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation




Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



0 70 140 280 Mètres

Echelle : 1:10 000



Presqu'île Béco POYA

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI



Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vil ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Baie de Nékoro POYA

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation




Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



0 120 240 480 Mètres

Echelle : 1:20 000



Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI


Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'amère mangrove clairsemée
- Formation d'amère mangrove moyennement dense
- Formation d'amère mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marquage à Cypéracées



Presqu'île Pindai POYA

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI


Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation




Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:13 000



Baie de Khun POYA

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI


Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:13 000

Plaine des Gaiacs VKP

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées

N
 0 85 170 340 Mètres
 Echelle : 1:15 000

Baie Blanche VKP

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI


Réalisation : Sabrina Virly Consultant


Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées





Plage de Franco VKP

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI


Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



164°49'0"E

164°49'30"E

164°50'0"E

Nord Goyeta VKP

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI


Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:10 000

164°50'0"E

164°50'30"E

164°51'0"E

21°19'0"S

21°19'30"S

21°20'0"S

21°19'0"S

21°19'30"S

21°20'0"S

Pwada Ubit

Thao

Mang Lafwa

Cawaci Dhalé

Konyén

Lafwa

Cathitaké Nya Konyén

Rvot


Pouembout VKP

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées

N
 0 115 230 460 Mètres
 Echelle : 1:25 000

Presqu'île de Foué VKP

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation




Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



0 40 80 160 Mètres

Echelle : 1:10 000



Koné - Kataviti VKP

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



0 87 575 350 Mètres

Echelle : 1:25 000

Pinjane VKP

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTST

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées

N
 0 50 100 200 Mètres

Echelle : 1:20 000

Oundjo VKP

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation




Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



0 250 100 Mètres

Echelle : 1:10 000



- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envaïssée ou inondée
- Formation d'amère mangrove clairsemée
- Formation d'amère mangrove moyennement dense
- Formation d'amère mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non infloresc. à la mangrove
- Végétation moyennement dense non infloresc. à la mangrove
- Végétation dense non infloresc. à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marquage à Cycolacées



04050 160 Metres

Echelle : 1:18 000

Baie de Chasseloup TEMALA

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inondée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inondée à la mangrove
- Végétation dense non inondée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:24 000

Anse Pouaco TEMALA

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation




Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:12 000



Canecout TEMALA

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:12 000

Anse Pouanga TEMALA

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation




Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:15 000



Pointe Patiepe OUACO

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:13 000

Tehelite OUACO

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:13 000

Nord Ouaco OUACO

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:12 000

Teu - Tinip OUACO

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI


Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:18 000


Est Baie Gomen KAALA GOMEN

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



0 90 180 360 Mètres

Echelle : 1:16 000

Pointe Iounga KAALA GOMEN

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation




Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



0 120 240 480 Mètres

Echelle : 1:22 000



Plaine de Bo KAALA GOMEN

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées

N
 0 70 140 280 Mètres
 Echelle : 1:14 000

Wharf Karembé KOUMAC

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI


Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:10 000



Nord Pandop KOUANG

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant


Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées

N
0 50 100 200 Mètres
Echelle : 1:10 000



Ouanac KOUMAC

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant


Carte de localisation




Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées

N
0 50 100 200 Mètres
Echelle : 1:10 000





Aérodrome KOUMAC

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées

N
 0 50 100 200 Mètres
 Echelle : 1:10 000

Sud Paagoumène KOUMAC

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées

N
 0 80 160 320 Mètres
 Echelle : 1:17 000

Référentiel géodésique RGNC 1991

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envaiesée ou inondée
- Formation d'amière mangrove clairsemée
- Formation d'amière mangrove moyennement dense
- Formation d'amière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inondée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inondée à la mangrove
- Végétation dense non inondée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marquage à Cycolacées

N
A 0 65 130 260 Mètres

Echelle : 1:15 000

Sud Baie Néhoué POUM

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:20 000


Nord Baie Néhoué POUM

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI


Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:20 000

Plateau Tho - Pointe Kim POUM

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation




Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:13 000



Presqu'île Golonne POUM

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation




Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



0 50 100 200 Mètres

Echelle : 1:15 000



Anse Pouane POUM

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées

N
 0 50 100 200 Mètres

Echelle : 1:15 000

Baie Poum POUM

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:12 000

Nord Baie Poum POUM

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation




Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:10 000



Presqu'île Tébane POUM

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:10 000

Sud Baie Banaré POUM

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:10 000

Nord Baie Banaré POUM

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTISI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation




Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:13 000



Pointe Tiabet POUM

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:12 000

Nord Ile Baaba POUM

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inondée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inondée à la mangrove
- Végétation dense non inondée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:15 000

Sud Ile Yandé POUM

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:18 000

Sud Ile Art BELEP

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation




Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inondée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inondée à la mangrove
- Végétation dense non inondée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:15 000



Sud Ile Pott BELEP

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:10 000


Poingame POUM

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inondée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inondée à la mangrove
- Végétation dense non inondée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:10 000

Pointe Pourthier POUM

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DSTI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation




Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inondée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inondée à la mangrove
- Végétation dense non inondée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Maraîchage à Cypéracées



Echelle : 1:10 000



Bayu POUM

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation




Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inondée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inondée à la mangrove
- Végétation dense non inondée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:10 000



Cabwi - Maa La Boac POUM

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation





Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inondée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inondée à la mangrove
- Végétation dense non inondée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:10 000





Nord Pointe Oumap POUM

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:10 000

Pujam ARAMA

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:15 000

Naraac - Phagaany ARAMA

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non infodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non infodée à la mangrove
- Végétation dense non infodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:15 000

Arama ARAMA

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation





Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:15 000





Bwalayet ARAMA

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non infodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non infodée à la mangrove
- Végétation dense non infodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:15 000

Sud Ile Balabio DIAHOT

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:20 000

Ouest Ile Balabio DIAHOT

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTST

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbusce
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:20 000

Nord Ile Balabio DIAHOT

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation




Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:20 000



Baie Pilou DIAHOT

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:10 000


Embouchure DIAHOT

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:15 000

Fleuve amont Diahot DIAHOT

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation




Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:23 000



Ouégoua DIAHOT

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:20 000

Pam DIAHOT

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:20 000

Tiari DIAHOT

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation




Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non infodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non infodée à la mangrove
- Végétation dense non infodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:20 000



Sainte Marie - Saint Paul BALADE

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vil ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non infodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non infodée à la mangrove
- Végétation dense non infodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:15 000

Tchambouenne POUEBO

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:17 000

Oubatche POUEBO

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:13 000

Sud Cap Colnett POUÉBO

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:25 000

Panié HIENGHENE

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant


Carte de localisation



- Classification botanique simple et structurale**
- Formation de Rhizophora clairsemée
 - Formation de Rhizophora moyennement dense
 - Formation de Rhizophora dense
 - Formation d'Avicennia clairsemée
 - Formation d'Avicennia moyennement dense
 - Formation d'Avicennia dense
 - Tanne nu
 - Tanne vif ou avec petit arbruste
 - Zone envasée ou inondée
 - Formation d'arrière mangrove clairsemée
 - Formation d'arrière mangrove moyennement dense
 - Formation d'arrière mangrove dense
 - Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
 - Formation mixte à Bruguiera dense
 - Autre formation mixte clairsemée
 - Autre formation mixte moyennement dense
 - Autre formation mixte dense
 - Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
 - Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
 - Végétation dense non inféodée à la mangrove
 - Mangrove morte ou convertie
 - Végétation indéterminée clairsemée
 - Végétation indéterminée moyennement dense
 - Végétation indéterminée dense
 - Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:25 000



Rivière Tanghène HIENGHENE

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inondée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inondée à la mangrove
- Végétation dense non inondée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:15 000

Lindéralique HIENGHENE

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant


Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inondée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inondée à la mangrove
- Végétation dense non inondée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées

N
0 75 150 300 Mètres
Echelle : 1:12 000



Tipindjé HIENGHENE

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation




Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inondée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inondée à la mangrove
- Végétation dense non inondée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



0 60 120 240 Mètres

Echelle : 1:10 000



Maina - Tiouandé HIENGHENE

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation




Classification botanique simple et structurale


- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non infodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non infodée à la mangrove
- Végétation dense non infodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



0 60 120 240 Mètres

Echelle : 1:10 000





Baie de Touho TOUHO

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI


Réalisation : Sabrina Virly Consultant


Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées





Kokengone - Tiwaka TOUHO

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées

N
 0 70 140 280 Mètres
 Echelle : 1:14 000

Saint Denis POINDIMIE

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant


Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inondée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inondée à la mangrove
- Végétation dense non inondée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées

N
 0 60 120 240 Mètres
 Echelle : 1:12 000



Rivière Amoa POINDIMIE

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inondée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inondée à la mangrove
- Végétation dense non inondée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées

N
 0 50 100 200 Mètres
 Echelle : 1:10 000





Paama POINDIMIE

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI


Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inondée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inondée à la mangrove
- Végétation dense non inondée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Paabu - Wiido POINDIMIE

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées

0 75 150 300 Mètres

Echelle : 1:15 000

Nord Tchamba POINDIMIE

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inondée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inondée à la mangrove
- Végétation dense non inondée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



0 40 80 160 Mètres

Echelle : 1:10 000

Rivière Tchamba POINDIMIE

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITT & DTSI


Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:20 000

Rivière Ponérihouen PONERIHOUEN

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant


Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inondée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inondée à la mangrove
- Végétation dense non inondée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées

N
 0 55110 220 Mètres
 Echelle : 1:15 000



Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non infestée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non infestée à la mangrove
- Végétation dense non infestée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Mariacae à Cécidéracées

N
0 35 70 140 Mètres
Ech

Echelle : 1:10 000

²⁵ Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation




Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envaissée ou inondée
- Formation d'amère mangrove clairsemée
- Formation d'amère mangrove moyennement dense
- Formation d'amère mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marquage à Cypréacées

N
0 40 80 160 Mètres
Echelle

Echelle : 1:12 000



Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Maraîchage à Cypracées

Echelle : 1:15 000

Baie Lebris HOUAILOU

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation




Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées

N
0 3570 140 Mètres

Echelle : 1:12 000



Nékoué HOUAILLOU

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inondée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inondée à la mangrove
- Végétation dense non inondée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



0 250 500 Mètres

Echelle : 1:10 000

Baie de KOUAOUA

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:15 000

Baie de CANALA

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:15 000

Port Mackau CANALA

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation





Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non infodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non infodée à la mangrove
- Végétation dense non infodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:10 000





Ouassé CANALA

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:20 000


Thio & Bota Méré THIO

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vil ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inondée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inondée à la mangrove
- Végétation dense non inondée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:10 000

Ile Nému - Port Bouquet THIO

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation




Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:18 000



Ile Tupéti THIO

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:18 000

Grand Borindi THIO

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation





Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inondée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inondée à la mangrove
- Végétation dense non inondée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:12 000





Saint Jean Baptiste THIO

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:12 000

Petit Borindi THIO

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTISI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation




Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inondée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inondée à la mangrove
- Végétation dense non inondée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:12 000



Ouinné THIO

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation




Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:20 000



Mamié à Muruto YATE

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inondée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inondée à la mangrove
- Végétation dense non inondée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:15 000

We Ngéré YATE

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Echelle : 1:15 000

Wé Békéré YATE

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTST

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation




Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



0 115 230 460 Mètres

Echelle : 1:18 000



Prequ'île Kwé Binyi YATE

Référentiel géodésique RGNC 1991

Sources de données : DITTT & DTSI


Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



Ile Nu Neae YATE

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



0 125 250 500 Mètres

Echelle : 1:20 000


Léline OUEVA

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemé
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemé
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vil ou avec petit arbusce
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inondée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inondée à la mangrove
- Végétation dense non inondée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées

N
 0 60 120 240 Mètres
 Echelle : 1:10 000

Tia Sala OUEVA

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITTT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbuste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées

N
 0 87.5 175 350 Mètres

Echelle : 1:15 000

Njimec OUVEA

Référentiel géodésique RGNC 1991

Source de données : DITT & DTSI

Réalisation : Sabrina Virly Consultant

Carte de localisation



Classification botanique simple et structurale

- Formation de Rhizophora clairsemée
- Formation de Rhizophora moyennement dense
- Formation de Rhizophora dense
- Formation d'Avicennia clairsemée
- Formation d'Avicennia moyennement dense
- Formation d'Avicennia dense
- Tanne nu
- Tanne vif ou avec petit arbruste
- Zone envasée ou inondée
- Formation d'arrière mangrove clairsemée
- Formation d'arrière mangrove moyennement dense
- Formation d'arrière mangrove dense
- Formation mixte à Bruguiera moyennement dense
- Formation mixte à Bruguiera dense
- Autre formation mixte clairsemée
- Autre formation mixte moyennement dense
- Autre formation mixte dense
- Végétation clairsemée non inféodée à la mangrove
- Végétation moyennement dense non inféodée à la mangrove
- Végétation dense non inféodée à la mangrove
- Mangrove morte ou convertie
- Végétation indéterminée clairsemée
- Végétation indéterminée moyennement dense
- Végétation indéterminée dense
- Marécage à Cypéracées



0 87.5 175 350 Mètres

Echelle : 1:15 000