A- PALANGRES LAGONAIRES

IRD

OBJECTIFS

1 – Analyser les différences survenues entre 1987 et 2000 sur les peuplements de poissons de ligne du lagon SW :

1-1- La répartition spatiale des espèces

1-2- Abondance et Poids des captures

1-3- Fréquences de taille

2 – Analyser les effets de l'environnement sur les espèces principales

3- Analyser l'effet des AMP sur ces poissons

4- Contraintes pour un suivi de ces ressources

La PALANGRE

METHODES

IRD

363 Poses **C1**

ZONECO

374 Poses **C2**

737 Poses

RESULTATS

1- Variations Temporelles et Spatiales

2- Effets des AMP

3- Mise en place d'un Suivi

Variations Temporelles & Spatiales

113 Espèces (79 lors de C1; 86 lors de C2)

1993 Poissons (3 030 kg) capturés lors de C1

1951 Poissons (3 309 kg) capturés lors de C2

ABONDANCE

PRESQUE IDENTIQUE

POIDS

1- entre CAMPAGNES
2- NOMBRE & POIDS

TOUTES ESPECES

Captures regroupées par carrés de 3 miles de côté

**LETHRINUS NEBULOSUS
POIDS**

**LETHRINUS NEBULOSUS
"BEC DE CANE"**

**LETHRINUS RUBRIOPERCULATUS
POIDS**

**LETHRINUS RUBRIOPERCULATUS
"BOSSU ROND"**

**LETHRINUS ATKINSONI
POIDS**

**LETHRINUS ATKINSONI
"BOSSU DORE"**

**GYMNOCRANIUS GRANDOCCLUS
POIDS**

**GYMNOCRANIUS GRANDOCCLUS
"BOSSU GROSSE RACE"**

VARIATIONS
SURTOUT
AU SUD

USAGE

EFFETS DE FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX

INTERACTIONS COMPLEXES

MODELES GENERAUX

		Exemples						
CAPTURES EN POIDS		Toutes Espèces	Loches	Bossus & Becs	Bossu doré	Bec de cane	Non Commercial	Commercial
1	Distance côte	1	1	1		1	1	4
5	Distance Nouméa	3				3	3	
2	Distance îlots - récifs		2		4	2	2	2
6	% Vase		3		1			
3	% Herbiers-Algues	2		2	2			3
4	Profondeur				3	4		1
NS	Saison							

PECHE

Les Chiffres indiquent le rang d'entrée des Facteurs dans les Modèles

CONCLUSIONS VARIATIONS TEMPORELLES & SPATIALES

1- Variations temporelles

- * **Très faibles** sur l'ensemble des Espèces
- * ↘ Labridae, Serranidae, Carangidae
- * ↗ Lethrinidae, Lutjanidae, Haemulidae

2- Variations Spatiales

- * **>> Temporel** sur l'ensemble des Espèces
- * ↗ des captures en poids dans le Sud
- * Peu de changements entre Uitoë et P.Boulari
- * ↘ des prises en nombre entre Uitoë et StVincent

3 – Forte influence des facteurs de l'**Environnement**

- * ↘ avec Profondeur, % Vase, Distance au récif
- * ↗ avec Distance à Nouméa, Carbonates

4 – Effet de la **Pêche** très important

5- Existence d'interactions complexes des facteurs sur les rendements

Effets des Réserves Marines (AMP)

Toutes Espèces

Serranidae

Loche Grisette

Loche Bleue

Loche Uitoë

Rémora

Carangidae

Lutjanidae

Loche Casteix

Lethrinidae

Bossu Blanc

Bossu Grosse Race

Bossu Doré

Bec de Cane

Bossu Rond

Perroquet Banane

Diversité

PUE
Nombre

PUE
Poids

EFFET AMP

NUL

☆ FAIBLE

☆☆ MOYEN

☆☆☆ FORT

	Diversité	PUE Nombre	PUE Poids
Toutes Espèces			
Serranidae			
Loche Grisette			
Loche Bleue			☆
Loche Uitoë		☆	☆☆☆
Rémora			
Carangidae			
Lutjanidae			
Loche Casteix			
Lethrinidae			
Bossu Blanc			
Bossu Grosse Race		☆	☆☆
Bossu Doré		☆	☆
Bec de Cane		☆	
Bossu Rond			☆☆
Perroquet Banane		☆	☆

CONCLUSIONS EFFET RESERVE MARINE

Seul l'effet « Déversoir » est testé ici

- 1 – Effet significatif mais dans l'ensemble peu marqué
- 2- Ce sont surtout les Becs & Bossus qui bénéficient de cet effet
- 3- La distance à la quelle cet effet est perceptible n'est pas connu mais probablement inférieur à 5 miles pour les espèces testées
- 4- Les espèces sensibles ont des traits de vie couvrant un large spectre suggérant que cet effet AMP peut bénéficier à beaucoup d'autres espèces

Mise Place d'un Suivi Poissons de Ligne

Les poissons de ligne sont une des principales ressources du lagon

La palangre est-elle une méthode efficace pour assurer un suivi des variations temporelles de ces populations ?

- 1- Test sur possibilité suivi de l'effet AMP près d'Aboré
- 2- Test sur possibilité de suivi des zones les plus riches

A

ZONE AMP
RECIF ABORE

B

ZONE PUE
MAXIMALE

	Nb. Poses	Espèces / Pose	Poissons / Pose	Grammes / Hameçon
A	45	2.8	4.9	62
B	83	5.1	9.2	196

} 1000 Poses simulées pour A et B

Recherche du Nombre de Poses nécessaires pour:

- * Détecter une différence (dans le temps) pré-établie
- * Connaître la différence qu'un nombre donné de poses peut détecter avec une probabilité connue

A **B**

% Minimum de Différence détectée pour 50 poses avec une erreur de 5%

CONCLUSIONS pour SUIVI TEMPOREL

- 1- Mauvaise détection des changements si Captures faibles
- 2- Bonne détection des changements de PUE en nombre et poids
si tests dans une zone avec rendements élevés
- 3- Nécessité de garder très rigoureusement la même méthode d'une campagne sur l'autre
- 4 – Environ 100 poses nécessaires pour détecter une différence de 10% en PUE en zone de PUE forte
- 5 – Coût et logistique envisageables pour suivi de la zone « Sud »

CONCLUSIONS

1 – Les ressources en poissons de ligne dans le lagon SW ont peu varié en 12 ans

2 – Parmi les causes possibles:

- * des recrutements importants permettant de compenser l'augmentation de la population et de l'effort de pêche
- * un effet des AMPs à grande échelle
- * les palangres ne sont pas assez sensibles pour détecter les variations
- * compensation de la ↘ de certaines espèces par ↗ d'autres espèces moins sensibles à la pêche

3 – Les palangres permettent de détecter des effets des AMP sur certaines espèces

4- Pour les zones les plus riches, les palangres pourraient être utilisées comme méthode de Suivi

PECHERIES RECIFALES

Premiers Résultats

IRD-CPS

OBJECTIFS

1 – Déterminer les Facteurs les plus importants pour les peuplements de poissons de récifs soumis à Exploitation

2 – Comprendre comment ces facteurs agissent sur les paramètres et structures

3 – Etablir s'il existe des différences entre sites, entre types de récifs ou suite à la pêche

4 – Tenter d'établir un indice « Potentiel Pêche Récifal » permettant de hiérarchiser les récifs en fonction de :

- * la résistance ou robustesse à la pêche
- * la quantité et qualité extractible (en qualitatif ou semiquantitatif)

SITES ETUDIÉS

222 TRANSECTS
« Toutes Espèces »

289 TRANSECTS
« Commercial »

511
Transects

TYPES de DONNEES

1- Peuplements de poissons

- * Diversité
- * Densité
- * Biomasse

2- Environnement récifal

- * Substrat
- * Organismes recouvrants (corail, algues)
- * Diversité à plusieurs échelles spatiales

FACTEURS
« LOCAUX »

3- Pêche

- * Nombre de pêcheurs locaux
- * Captures pêcheurs locaux
- * Part subsistance et part « circuit économique »
- * Consommation de poissons locale

FACTEURS
« GRANDE
ECHELLE »

4 – Géomorphologie

- * Nature et surface des différents types de récifs
- * Cartographie des récifs
- * Indices de diversité pour chaque type de récifs

GENERALITES

556 Espèces échantillonnées

214 000 Poissons observés

527 Personnes interrogées

Données très complexes

Premiers résultats
présentés ici

Seul LIFOU a une Diversité plus faible

- 1- Cote EST > OUEST
- 2- Koné le plus faible
- 3 –Ouassé a la plus forte Biomasse

TOUTES ESPECES

Legend:

- Lifou
- Kone
- Moindou
- Ouasse
- Thio

Diversité

Peu de Différences entre **Sites** ou **Type de Récif**

Densité

Peu de Différences entre **Sites** ou **Type de Récif**

Biomasse

Augmentation avec influence Océanique pour Koné, Ouassé, Thio

ESPECES CONSOMMABLES

1- Koné le plus faible dans tous les compartiments

2- Moindou a un % d'espèces vendable faible

3 – Le % vendable à Ouassé est plus fort qu'ailleurs

BIOGEOGRAPHIE

DIVERSITE

LES SITES de NC
ont des valeurs
Intermediaires

- Lifou
- Kone
- Moindou
- Ouasse
- Thio

WEST

EAST

DENSITE

BIOMASSE

DENSITES & BIOMASSES
LES PLUS HAUTES DE LA
REGION

COMBINES A UNE
DIVERSITE MOYENNE

UN POTENTIEL PECHE
> **MOYENNE REGIONALE**

- Lifou
- Kone
- Moindou
- Ouasse
- Thio

FACTEURS GRANDE ECHELLE

INFLUENCE DECROISSANTE
DES FACTEURS

RANG D'ACTION
DES FACTEURS

Biomasse	CONSOMMABLE		COMMERCIAL	
REGION	1		1	
TYPE RECIF	2		2	
PECHE	3		3	

USAGES

INFLUENCE DECROISSANTE
DES FACTEURS

RANG D'ACTION
DES FACTEURS

Biomasse	15-30 cm	30-50 cm	>80 cm	50-80 cm
REGION	1	3	1	1
TYPE RECIF	2	1	1	NS
PECHE	3	2	3	NS

TAILLES

Pb ECHANTILLONNAGE

NS : Non Significatif

INFLUENCE DECROISSANTE
DES FACTEURS

RANG D'ACTION
DES FACTEURS

Biomasse	BROUTEURS	PISCIVORES	CARNIVORES	HERBIVORES
REGION	1	1	2	2
TYPE RECIF	2	2	3	1
PECHE	3	3	1	3

TROPHIQUE

LES DIFFERENTES
CATEGORIES DE
POISSONS ONT DES
REponses SPECIFIQUES

AU NIVEAU ACTUEL
DE LA PECHE

LA PECHE N'EST PAS
LE PREMIER
FACTEUR A AGIR SUR
LA BIOMASSE

GESTION DEPEND EN 1^{er}
DE LA REGION ET DE
L'ENVIRONNEMENT

FACTEURS LOCAUX

MODELE

FACTEURS LOCAUX

A - Profondeur
% Fonds Meubles
% Fonds Durs
% Corail Vivant
% Algues

VALEURS

B - Diversité Corail
Diversité Substrat
Diversité Paysage

VARIABLES

FACTEURS GRANDE ECHELLE

Type de Récif
Région
Pêche

PARAMETRES ANALYSES

Diversité
Densité
Biomasse

Structures Trophiques
Taille
Usage

EXEMPLES de RELATIONS "SIMPLES"

Effort de Pêche

Abondance Espèces Commerciales

Plusieurs dizaines de Graphes similaires

Nécessité de Modèles Généraux

Cas de la Diversité

	TOUT	Piscivores	Carnivores	Planctono- phages	Herbivores	Brouteurs	
LOCAL - A	Profondeur	☆☆		☆☆☆		☆☆	3
	% Fonds Meubles			☆			
	% Fonds Durs				☆☆☆		
	Corail						
	Algues	☆	☆☆			☆☆	2
LOCAL - B	Div. Corail	☆		☆☆☆			
	Div. Substrat				☆		
	Div. Paysage	☆☆☆	☆☆	☆	☆	☆☆☆	
REGIONAL	Type Récif	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆	☆☆☆	1
	Région	☆☆☆	☆☆☆		☆☆☆	☆☆☆	
	Récif x Région		☆☆	☆		☆☆☆	
	Pêche	☆	☆☆			☆☆☆	

Ensemble des Modèles

	DIVERSITE				DENSITE				BIOMASSE				
	TOUT	TROPHIQUE	TAILLE	USAGE	TOUT	TROPHIQUE	TAILLE	USAGE	TOUT	TROPHIQUE	TAILLE	USAGE	
Facteurs Locaux <i>Valeur</i>	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	2	1	3
Facteurs Locaux <i>Variabilité</i>	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	3	3	2
Facteurs Grande Echelle	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1

Les N° représentent les rangs d'importance dans les modèles

1- Facteurs Grande Echelle >> Facteurs Locaux

NECESSITE DE PRISE EN COMPTE LA REGION DANS LA GESTION

2- La Variabilité > Valeurs absolues pour Facteurs Locaux

LA DIVERSITE DE L'ENVIRONNEMENT TRES IMPORTANTE

3- La Valeur des Facteurs Locaux importante pour les espèces pêchées

PRESERVER CORAIL, ALGUES & DIVERSITE DU FOND

4- Diversité, Densité, Biomasse

- * même réponse générale aux Facteurs
- * Robustesse : Diversité > Biomasse > Densité

DES CHANGEMENTS IMPORTANTS DE DIVERSITES SONT A SURVEILLER

CONCLUSIONS- Partie B

Pour les peuplements de poissons récifaux

1- Les Facteurs à Grande Echelle > Facteurs Locaux

2- La pêche (à son niveau actuel) n'est pas le premier déterminant des niveaux et de l'organisation des peuplements

**3 – 'Qualité' actuelle des Peuplements:
Côte Est > Côte Ouest**

**4 – La biomasse en NC est > aux autres pays du
Sud Pacifique**

5- *Estimer l'effort de pêche est très complexe et nécessitera une réflexion sur les méthodes*

PERSPECTIVES

PECHERIES RECIFALES

LIEN ENTRE DIVERSITE DES PAYSAGES
SOUS-MARINS & POTENTIEL DE PECHE

CONSTRUCTION DE MODELES PREDICTIFS POUR L'ENSEMBLE
DU PACIFIQUE SUD

TEST D'INDICATEURS DES EFFETS DE LA PECHE RECIFALE
SUR LES PEUPELEMENTS DE POISSONS

SERRANIDAE

LUTJANIDAE

LABRIDAE

HAEMULIDAE

C1 (1984-1987) : pas d'AMP permanente en existence

C2 (1999-2001) : AMP de Aboré (et dépendances), I.Maitre, I.Signal, I.Larégnère, I.Canard, I,Bailly, Ricaudy

Si zone pêchée proche d'une AMP lors de C2

↗ Espèces
Commerciales

↘ Espèces
de rejet

Si zone pêchée éloignée des AMP lors de C2

Effets opposés
aux précédents

CONSUMMATEURS PRIMAIRES

DIVERSITE

- Peu de différence entre sites
- Dominance des consommateurs « primaires »

DENSITE

- Dominance Côte EST
- Dominance des consommateurs « primaires »
- Piscivores et MacroCarnivores sont en faible densité

BIOMASSE

- Piscivores, MacroCarnivores et Herbivores ont de fortes Biomasses pour de faibles Densités
- Forte Biomasse Brouteurs sur Côte EST
- Faible % Piscivores sur Côte EST; opposé à Moindou

■ Lifou
■ Kone
■ Moindou
■ Ouasse
■ Thio

STRUCTURES

1- Les espèces >50cm:

Peu diversifiées

Peu abondantes

Biomasse importante

2- Densité dominées par petites espèces, surtout sur côte EST

3 – La différence en Biomasse sur côte Est surtout due aux 16-50cm