Projet EliCopTr

Introduction

Copepodes:

Metazoaires les plus abondants: 250 familles, 2.600 genres et 21.000 espèces décrites.
>200.000 espèces existantes (estimation)

Colonisé **tous les milieux aqueux**
(ED, EDM, Antarctique aux Hot-springs, Caves...)

Rôle écologique vital (Transforme le phytoplancton en matériel assimilable pour réseaux trophiques supérieurs)

Introduction

- **Proies naturelles** d'une majorité de larves de poisson et de poisson planctivores.

- **Enorme variation de taille, forme et couleur:**

Introduction: Classification

- 10 ordres de copépodes:

Calanoides

Harpacticoides

Cyclopoides

3 considérés comme ayant un fort potentiel en temps que proies vivantes pour les écloséries

Plusieurs genres parasitiques et/ou symbiotiques

Introduction: Classification

3 ordres avec un fort potentiel pour l'aquaculture

Calanoides

Pélagique/benthopélagique

Reproduction Sexuée

Ponte libre/sac d'œufs

Nourrissage par filtration

Herbivores/Omnivores

Cyclopoïdes

Pélagique, Commensal or Parasitique

Reproduction Sexuée

Sac d'œufs

Nourrissage raptorial

Carnivores/Omnivores

Harpacticoides

Benthique, parfois pélagique

Reproduction Sexuée/
parthénogenèse

Sac d'œufs

Nourrissage raptorial et
filtration

Omnivore/Détritivore

Aquaculture: **Limitations** des copépodes

1- **Densités de stockage** faible vs. *Artémia* et rotifères

2500 ind./mL

V.S.

2 ind./mL

2- **Nutrition complexe** et plus sensible aux problèmes de **qualité d'eau**

3- **Recherche limitée**: Seules quelques espèces étudiées + Cultures a grandes échelles établies uniquement pour quelques espèces

4- **Paramètres optimales de cultures** inconnus pour la majorité des espèces

5- **Techniques de stockage** en développement

V.S.

(espèces tempérées)

Aquaculture: **Avantages** des copépodes

1- **Variation de taille**: Stades nauplii très petit + grande **variation de taille** disponible pour les larves, **en particulier pour les poissons récifaux** qui possèdent une très petite bouche lors du 1er nourrissage

Pas d'alternative à
la petite taille des
stades nauplii

2- **Contenu nutritionnel** supérieur aux autres proies vivantes. Haute teneur en **acides aminés**, **acides gras essentiels** + haut contenu **enzymatique**. **Proie naturel** → (60% des contenus stomacaux)

3- **Déplacement**: Stimule les réponses prédatrices chez les jeunes larves
→ améliore les taux d'ingestion

4- **Cycle de vie court** (4 a 6 jours pour espèces tropicales) + **productivité importante** (20-40 œufs/24hrs)

Aquaculture: Copepodes **proies essentielles**

Augmentation du nombre d'espèces pour lesquelles les **proies vivantes traditionnelles** sont **insuffisantes** et/ou **inadaptées**, en particulier les espèces **récorales** à forte valeur commerciale

- Vivaneaux (*Lutjanidae* spp)

- Mérous (*Serranidae* spp)

- Hippocampes (*Hippocampus subelongatus*)

- Dhufish (*Glaucosom hebraium*)

- Espèces ornementales de poissons et de crustacés

→ Forte demande en copépodes pour développer l'aquaculture de ces espèces

→ Besoin d'améliorer les méthodes de culture intensives et de maximiser la productivité des copépodes

Culture de copépodes

Objectif: Obtenir des populations pures et saines à une densité relativement haute, maintenues de façon fiable sur le long terme.

« *Evaluation des caractéristiques biologiques et nutritionnelles et de l'aptitude à l'**EL**evage d'espèces Indigènes de **COP**épodes dans le but de favoriser la **TR**ansition endo-exotrophie de larves de poissons marins d'élevage et d'ornementation. »*

➔ Post doctorat réalisé dans le cadre d'une opération ZoNéCo, hébergée au CCDTAM, cofinancé et encadré scientifiquement par l'IFREMER

Objet: **Expérimentation et recherche + répondre aux besoins en copépodes des opérateurs locaux** (CCDTAM, Aqualagon, ADL)

Copépodes et Nouvelle Calédonie

- Très peu d'étude sur les **assemblage naturels** (années 80 et 90)
- Aucun travail réalisé sur le **potentiel des espèces de copépodes indigènes** en éclosérie aquacole
- Challenge **du nourrissage larvaire de *Lutjanus sebae*** au CCDTAM
- Important potentiel en **recherche appliquée** mais aussi en recherche **fondamentale**

Méthodes générales

Isolation des culture souches:

- Echantillonnage depuis le milieu

- Tri par espèce en laboratoire
- T°, S, photopériode, aération contrôlées
- Incubation dans des cultures de volumes croissants

- Nourrissage quotidien cocktail de microalgues

Echantillonnage

Baie de Foué

Channel 'CCDTAM'

Filet a plancton de 65 μm & 200 μm

Espèces isolées 2013

Calanoides

Harpacticoides

Cyclopoides

CCDTAM: Espèce cible

Bestiolina similis (Calanoida, Paracalanidae)

- Stade de développement **planctoniques**
- Important contenu **nutritionnel** et **enzymatique**
- Bonne productivité (20-40 œufs/24h)
- T°, **Sal** et **régime microalgues** connus
- **Abondant** dans le milieu a proximité du CCDTAM

Femelle
450-550 µm

Male
400-500 µm

Nauplius

N-1: 75-80 µm

N-3: 110 µm

Adulte (C-6)

Amélioration notable des taux
de survie larvaire de *L. sebae* ?

CCDTAM: Culture des populations de copépodes

- Salle entièrement dédiée à la culture de copépodes
 - 3 x 250 L: Cultures populations « souches »
 - 7 x 400L: Cultures populations « production »
- Nourrissage microalgues vivantes produites dans une salle dédiée au CCDTAM (1 personne a temps plein)
 - Suit des paramètres de qualité d'eau
 - Siphonage et changement d'eau réguliers

CCDTAM: pontes *L. sebae* 2013

3 actions copépodes entreprises:

1) Volet capture zooplancton

2) Volet mésocosme

3) Volet culture pure

- 2 bacs larvaires: 9 et 6 m³

- Bassin extérieur 2500 m³

- Introduction de copépodes en culture pure dans cycles larvaires

→ Recommandation sur méthodes échantillonnages

→ Vérification composition espèces copépodes

→ Vérifier composition copépodes + zooplanctons

→ Essai de capture de larve pour contenus stomacaux

→ Fournitures assurées par TC

→ Tri éventuel

→ Suivi densité copépodes

→ Contenus stomacaux des larves (présence ou non de copépodes)

+ Consultance G. Schipp (budget CCDTAM) pour optimiser l'utilisation des copépodes en élevage larvaire

CCDTAM: pontes *L. sebae* 2013

Résultats:

1) Volet capture zooplancton

2 bacs larvaires: 9 et 6m³

- Bonne densité en copépodes maintenue (0,5 – 1,5 nauplii/mL)
- 4 à 6 espèces présentes
- 100% de mortalité larvaire à J14 (hypothèse : bloom de vorticelle et de méduse)

2) Volet mésocosme

Bassin extérieur 2500 m³

- Echec de la capture des larves avec piège lumineux
- Survie globale de 0,4 %, sans fertilisation ni ajout de copépodes

CCDTAM: pontes *L. sebae* 2013

3) Volet Culture Pure

4 élevages larvaires réalisés avec copépodes de culture :

- 3 avec protocole “Eau Verte” Indonésien (L1, L2, L3 bis)
 - 1 avec protocole “Schipp” Australien (L2 Schipp).

Taches accomplies dans le cadre EliCopTr:

- **Maintien des cultures** intensives de copépodes afin d’assurer une production fiable et continue pour les besoins du CCDTAM.
- **Suivi quotidien de la densité en copépodes** et de la **composition nauplii/copépodites** dans les bacs larvaires de J0 à J12.
- **Ajout de copépodes dans les élevages larvaires** depuis les cultures intensives dans le cas où les densités observées dans les bassins larvaires sont trop faibles.
- Protocole Schipp: **Suivi quotidien de la concentration en microalgues dans les bassins larvaires**. Ajustement si nécessaire.

CCDTAM: pontes *L. sebae* 2013

Résultats: volet culture pure

0,3 à 2% de survie avec protocole « eau verte ».

8% de survie avec protocole « Schipp »

Pontes *L. sebae* 2013

Manipulations réalisées dans le cadre d'EliCopTr

3 expériences pilotes conduites:

- Exp. 1 et 2: Volumes de 40L
- Exp. 3: Volumes de 250L

- Œufs embryonnés introduits volumétriquement
 - Eclussions après 10-15h
- Larves nourris exclusivement avec copépodes

Pontes *L. sebae* 2013

Résultats expériences 40L:

- Expérience stoppée à **J9**
- Confirmation que les copépodes sont suffisant pour passer le **cap de la transition endo-exotrophie**
- Détermination du **timing de l'ouverture buccale** (36-48h après éclosion)
- Mesure de **l'ouverture buccale**
- **A jeun**: 100% mortalité larvaire **entre J5 et J6**

Pontes *L. sebae* 2013

Résultats expérience 250L:

- Larves amené jusqu'à J16 (nourries uniquement de copépodes) puis transférée hors salle copépodes pour nourrissage sur *Artémia*
- à J14: Comparaison de la taille des larves nourries uniquement sur copépodes vs. uniquement rotifères

J14 copépodes
(3,94 ± 0,37 mm)

J14 rotifères
(3,45 ± 0,26 mm)

Pontes *L. sebae* 2013

Conclusions problématique Copépode CCDTAM à la fin 2013:

- L'introduction de copépodes à partir de J2 PH est nécessaire pour obtenir des survies acceptables chez *L. sebae*.
- Taux de survie à J8: 10-100x supérieurs en comparaison avec un schéma de nourrissage classique
- Taux de survie à J30: 30-50x supérieurs en comparaison à un schéma de nourrissage classique
- Fortes indications de taux de croissances bien supérieurs par rapport à un régime rotifère
- Meilleur taux de conformité des alevins sur lots nourris avec copépodes

EliCopTr

Manipulations en cours:

- Collaboration avec l'Aquarium Des Lagons (ADL) de Nouméa sur l'élevage larvaire d'une espèce de *Dascyllus*.
- Expériences réalisées précédemment a l'ADL: 100% de mortalité à J4 avec nourrissage rotifères

Expérience EliCopTr:

3 traitements (4 répliquas chacun):

- 1) Rotifères uniquement (contrôle)
- 2) Copépodes uniquement
- 3) Copépodes + Rotifères

Travail en cours (Février-Mars 2014)

EliCopTr

Manipulations en cours:

Expérience pilote sur le type de substrat idéal pour la culture du copépode benthique *Tisbe* sp. (harpacticoïde).

- 5 types de substrats différents testés (6 répliques chacun)
- 6 femelles ovigères introduites initialement
- Nourrissage tous les 3 jours
- Croissance de population mesurée sur 45 jours

Travail en cours (Février-Mars 2014)

EliCopTr: Perspectives 2014

- Essai larvaire sur *Dascyllus*
- Expérience **nourrissage** *Tisbe* sp. sur pate d'algue et algue congelées
- **Optimiser les conditions de culture pour les 3 espèces cibles** (régime microalgues, paramètres de qualité d'eau). Essais de microalgues type *Rhodomonas*.
- Travail sur les **dynamiques de population** en culture intensive (développement de méthodes pour optimiser la production et la synchronisation des pics de nauplii)
- Optimisation des **méthodes de culture** (semi-continue, recirculation, récolte automatique des nauplii...)
- Vérification de la possibilité de **production en bacs extérieurs** (Volume de culture total augmenterait de 3 à 28m³).
- **Analyse biochimique** des copépodes suivant différents régimes microalgues
- Présentation résultats: 12^{eme} **Conférence Internationale sur les Copépodes**. Séoul, Juillet 2014.
- Fin 2014, (en cas d'extension du post-doc): **Manip nourrissage comparatif copépodes vs. séquence classique pour les pontes *L. sebae* CCDTAM**. Analyse du **développement larvaire** (survie, croissance, malformation, pigmentation) + **contenus stomacaux** (j3-12) + **analyse biochimique des larves** (+activité enzymatique)

EliCopTr: planning provisoire 2013-2014

Mois	2013												2014					
	Octobre			Novembre			Decembre			Janvier	Fevrier	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre
Semaine	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52						
-Prelevement zooplancton baie + channel CCDTAM	■	■	■	■														
-Tri copepodes en laboratoire -Isolement par espece	■	■	■	■	■	■	■											
-Culture Pure Petite Echelle 50ml -> 3L		■	■	■	■	■	■	■										
-Culture Pure Moyenne Echelle 35L+					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
-Culture Pure Grande Echelle 250L+																		
CCDTAM: Preparation pontes L.sebae Copepodes a fournir + Exp. pilote sur elevage larvaire (dependant des pontes)										■	■	■	■	■	■	■	■	
CCDTAM: Analyse des contenus stomacaux des larves de pouattes de J3 a J12										■	■	■	■	■	■	■	■	
Etape 1 : Optimisation parametres principaux (T, S, regime)																		
Etape 2 : Optimisation des parametres pour les 'especes cibles'																		
Etape 3 : Management de la production (pic de population; synchro de nauplii)																		
Etape 4 : Analyse bio-chimique des especes cibles																		
Fournir en copepodes Aqualagon/ADL +Etude sur les larves de picots?																		
Redaction et soumission de maniscrits

Pour plus de renseignements sur EliCopTr:

<http://wwz.ifremer.fr/ncal/Presentation/Les-equipes-et-leurs-travaux/Pisciculture/ELICOPTR>

www.zoneco.nc
www.adecal.nc
www.lfremer.fr